

Rundschreiben


10.05.2021

An alle Maisanbauer,

die Maisausaat ist größtenteils erfolgt. Durch die kühle Witterung der letzten Wochen hat sich bisher wenig im Boden getan. Die Niederschläge der letzten Tage und die jetzt etwas wärmeren Temperaturen sollten aber zeitnah zum Auflauf von Mais und auch Unkräutern führen. Um dem Mais ein leichtes auflaufen zu ermöglichen, sollte dieser frühzeitig und verträglich behandelt werden, damit die Konkurrenten um Wasser und Nährstoffe ausgeschaltet werden.

In unserer intensiven Maisanbauregion sollte der Herbizideinsatz in **Spritzfolgen**, d.h. zu zwei Terminen praktiziert werden. **Auf diese Weise werden die dort verzettelt und später auflaufenden Unkräuter (z.B. Knöteriche) und Hirse-Arten sicherer, verträglicher und gezielter bekämpft.**

Empfehlung Spritzfolge → Gezielt, sicher, verträglich und kostengünstig



Eine Einmalbehandlung ist natürlich auch möglich und kann mit den vollen Aufwandmengen der oben aufgeführten Produkte erfolgen!

Gezielt Nachlage

Breite Mischverunkrautung, Windenknöterich,
 Landwasserknöterich, Melde, Gänsefuß, Distel

**0,2 kg/ha Arrat
 + 1,0 l/ha Dash**

Bitte Rückseite beachten!

Kartoffeldurchwuchs

Leider werden uns auch in diesem Jahr wieder die Probleme mit Durchwuchskartoffeln im Mais begleiten. Zur Bekämpfung der Durchwuchskartoffeln haben sich Produkte wie Callisto/Logano (Wirkstoff: Mesotrione) oder Calaris bewährt.

Die Empfehlung auf Flächen mit Kartoffeldurchwuchs und breiter Mischverunkrautung:

Spectrum Gold + Callisto

2,0 l/ha + 0,8 l/ha

Nachlage Kartoffeldurchwuchs,
Breite Mischverunkrautung, Nachtschatten

1,0 l/ha Callisto,

oder 0,35 l/ha Effigo

Grasuntersaat

Auf Problemstandorten mit Storchschnabel und allen Hirsearten steht die Unkrautbekämpfung incl. Bodenherbiziden im Vordergrund, hier nach Möglichkeit

keine Untersaat planen!

Mischverunkrautung +
Hühnerhirse

ACDC-Pack
0,3 l + 0,3 l

Hühnerhirse, Borstenhirse,
Gräser

Laudis + Nisshin*
1,5 l + 0,5 l/ha

Maisuntersaat 20 kg/ha

**Pneumatikstreuer ab
70-80 cm Wuchshöhe des
Mais (nach Möglichkeit
flach bearbeitet)**

* Sortenverträglichkeit
beachten! Untersaat
frühestens 2-3 Wochen
nach Anwendung von
Sulfonylharnstoffen säen



Wir halten auf unseren Lagerstellen passende Untersaatmischungen (Dt. Weidelgras und Welsches Weidelgras) für sie bereit.

Mais Bohnen Gemenge müssen **zwingend im Vorauf**lauf behandelt werden. In diesem Mischanbau sind keine Herbizide im Nachauflauf möglich, hier bleibt nur der Einsatz der Maishacke.

Spectrum + Stomp aqua

1,25 l + 2,5 l/ha

Maishacke



Gerne schauen wir uns auch vor Ort ihre Flächen an!

Günter Ramaker (0173- 537 29 52), Nico Veenaas (0172- 603 26 27) und Gerrit Jan Klompmaker (0173- 518 54 49) stehen dazu gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen

Raiffeisen Waren Ringe- Wielen- Georgsdorf eG