


## **Aktuelles zum Getreide**

18.05.2021

Die Getreidebestände haben sich allgemein gut entwickelt und im Wintergetreide sollte die erste Fungizidmaßnahme abgeschlossen sein. Auf einigen Flächen, gerade bei Gerste auf nass/kalte Standorten, ist die Entwicklung jedoch noch etwas zurück. Hier würde eine Warmwetterphase gut tun. Im Sommergetreide sollte, wo noch nicht geschehen, die Herbizidmaßnahme erfolgen.

**Unsere Herbizidempfehlung im Sommergetreide:**



Bei **Melde** und **weißem Gänsefuß** bietet sich eine Zugabe von **1,0 l. / ha U46M** an, bei **Windhalm** oder **Flughafer** sollte eine Zugabe von **0,9 l. / ha Axial 50** erfolgen.

Gegen **Durchwuchskartoffeln** sollte mit einem Fluroxypyrrhaltigem Produkt behandelt werden (**Ariane C, Waran**)

**Auf der Rückseite finden Sie die Empfehlung für die Abschluss-spritzung Fungizid im Wintergetreide!**



## Fungizid Abschlussbehandlung Wintergetreide

Im Wintergetreide liegt bei den ersten Beständen die Abschluss-spritzung an. Zwischen der ersten Spritzung und der Abschluss-spritzung sollten maximal 4 Wochen liegen, um einen optimalen fungiziden Schutz des Getreides zu gewährleisten. Auch hier gilt, sobald das Wetter es zulässt und die Bestände trocken sind, sollte die Behandlung erfolgen.

### Unsere Empfehlung:


Triticale und Roggen (speziell gegen Roste)

**Elatius Plus + Orius**  
0,6 + 0,9 l/ha

Winterweizen und Wintergerste

Sommergerste

**Revystar + Priaxor**  
1,0 + 1,0 l/ha



Wir sehen uns gerne Ihre Flächen an.

Günter Ramaker erreichen Sie unter 0173-537 295 2

Nico Venaas erreichen Sie unter 0172-603 262 7

Gerrit Jan Klompaker erreichen Sie unter 0173-518 544 9

Mit freundlichen Grüßen

Raiffeisen-Waren

Ringe-Wielen-Georgsdorf eG